

# Wulagasaurus dongi

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Il **wulagasauro** (***Wulagasaurus dongi***) è un dinosauro erbivoro appartenente agli adrosauri, o dinosauri a becco d'anatra. Visse nel Cretaceo superiore (Maastrichtiano, circa 70 milioni di anni fa) e i suoi resti sono stati ritrovati in Asia orientale (Cina).

## Indice

**Descrizione**

**Classificazione**

**Paleoecologia**

**Bibliografia**

**Collegamenti esterni**

## Descrizione

Questo dinosauro è noto grazie ai resti di uno scheletro incompleto, comprendente parti del cranio (scatola cranica, mascelle), dei cinti pettorale e pelvico e delle zampe anteriori. L'aspetto doveva essere simile a quello degli adrosauri primitivi come *Bactrosaurus*: il corpo era relativamente snello e doveva essere sostenuto da zampe posteriori possenti. Il cranio, con tutta probabilità, era sprovvisto di cresta ma era dotato di un becco piatto, mentre i denti erano disposti in batterie nella parte posteriore delle mascelle. L'omero di *Wulagasaurus* indica che questo animale possedeva un'insolita morfologia della zampa anteriore, con zone d'inserzione dei muscoli non comuni ad altri adrosauri. La mandibola, inoltre, era lunga e sottile.

## Classificazione

Descritto per la prima volta nel 2008, questo dinosauro è stato descritto come il più primitivo tra gli adrosaurini, ovvero il gruppo di dinosauri a becco d'anatra dotati di cranio piatto. Ciò suggerisce un'origine asiatica per la famiglia degli adrosauridi, anche se *Wulagasaurus* è stato rinvenuto in terreni relativamente recenti (Maastrichtiano). Il nome generico deriva da Wulaga, la località presso la quale sono stati ritrovati i resti, mentre l'epiteto specifico è in onore di Dong Zhiming, uno dei massimi paleontologi cinesi.

## Paleoecologia

Questo animale è uno dei numerosi adrosauri i cui resti sono stati ritrovati nella zona del fiume Amur, lungo il confine tra Cina e Russia, dal 2000 in poi. Tra gli altri adrosauri della zona, si ricordano *Charonosaurus*, *Amurosaurus* e *Kerberosaurus*. I resti di *Wulagasaurus* sono stati ritrovati in un "letto d'ossa" dominato da

### *Wulagasaurus*



Mandibola di *Wulagasaurus dongi*

### Classificazione scientifica

<u>Dominio</u>	<u>Eukaryota</u>
<u>Regno</u>	<u>Animalia</u>
<u>Phylum</u>	<u>Chordata</u>
<u>Classe</u>	<u>Reptilia</u>
<u>Superordine</u>	<u>Dinosauria</u>
<u>Ordine</u>	<u>Ornithischia</u>
<u>Sottordine</u>	<u>Ornithopoda</u>
<u>Infraordine</u>	<u>Iguanodontia</u>
<u>Famiglia</u>	<u>Hadrosauridae</u>
<u>Genere</u>	<i><b>Wulagasaurus</b></i>
<u>Specie</u>	<i><b>W. dongi</b></i>

fossili di un altro adrosauro, il lambeosaurino *Sahaliyania*. È probabile, quindi, che *Wulagasaurus* fosse un componente "minore" dell'ambiente dell'Amur.

## Bibliografia

---

- Godefroit, Pascal; Hai Shulin; Yu Tingxiang; and Lauters, Pascaline (2008). "New hadrosaurid dinosaurs from the uppermost Cretaceous of north-eastern China" (pdf). *Acta Palaeontologica Polonica* 53 (1): 47–74. doi:10.4202/app.2008.0103. <http://www.app.pan.pl/acta53/app53-047.pdf>.

## Collegamenti esterni

---

- 
- (EN)  *Wulagasaurus dongi*, su *Fossilworks.org*.

---

Estratto da "[https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Wulagasaurus\\_dongi&oldid=105842610](https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Wulagasaurus_dongi&oldid=105842610)"

---

**Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 20 giu 2019 alle 20:32.**

Il testo è disponibile secondo la [licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo](#); possono applicarsi condizioni ulteriori. Vedi le [condizioni d'uso](#) per i dettagli.